

Vaginitis inflamatoria descamativa: a propósito de un caso

Ana Vázquez del Campo, Alazne de Castro Momoitio, Diego Erasun Mora, Alicia Alcantud García, Alicia Vega Alvarez, Elena Juncal Ruiz,
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

Introducción y objetivos

La coitorragia es uno de los criterios de derivación de las mujeres a las unidades de colposcopia. El objetivo de este trabajo es dar a conocer el caso de una coitorragia cervicovaginal con un complejo diagnóstico diferencial y refractaria a los tratamientos habituales.

Material y métodos

Paciente de 33 años desde hace 5 años presenta coitorragia intensa, dispareunia y spotting mensual. En la colposcopia se objetiva una lesión ulcerada exocervical en labio anterior en forma de semiluna invertida, sangrante al roce, ectopia y ausencia de lesiones acetoblancas. La vaginoscopia objetiva una mucosa vaginal muy friable, y sangrante de manera generalizada.

Resultados

- ✓ Tras búsqueda bibliográfica se decide tratamiento empírico ante la posibilidad diagnóstica de un caso de VID (vaginitis inflamatoria descamativa).
- ✓ Se indica tratamiento con óvulos de clindamicina, que precisan ser suspendidos por una respuesta alérgica.
- ✓ Posteriormente se indica tratamiento con corticoides intravaginales, limitado por ausencia de presentación en forma de óvulos.
- ✓ Tras el tratamiento la coitorragia ha cedido parcialmente pero no de forma completa

Conclusión

La coitorragia persistente y refractaria a tratamientos habituales puede ser un reto en la consulta que precisa de un amplio diagnóstico diferencial y en ocasiones de la realización de LLETZ terapéuticos o tratamientos tópicos a largo plazo.

