

MEJORIA EN FSFI/FSM CON OSPEMIFENO EN PACIENTES CON RADIOTERAPIA POR CANCER DE CÉRVIX



R. Mora Ruiz-Moyano; S. Vilares Calvo; M. Martinez Dolara. H.U. Marqués de Valdecilla (Santander-Cantabria). H. Provincial de Pontevedra (Pontevedra-Galicia)

ANTECEDENTES / OBJETIVOS:



La mayoría de las mujeres afectas de cáncer cervical son **jóvenes** o de mediana edad, y las tasas de supervivencia aumentan continuamente. Presentan efectos 2º inducidos por los tratamientos generando un alto grado de morbilidad vaginal y disfunción sexual persistente. Se deben prevenir los cambios vaginales o aliviarlos después de la terapia para mujeres de todas las edades. En la mayoría de las ocasiones lo hacemos de **forma tardía**. La eficacia de los SERM como opción terapéutica en el cáncer de cérvix está poco investigada. Se ha efectuado un único estudio en pacientes sin radioterapia.

MÉTODOS:

Se ha propuesto tratamiento con **ospemifeno durante 3 meses a 10 pacientes** de cáncer de cérvix que han recibido **radioterapia** y presentan **intensa atrofia vulvo vaginal**. De ellas, 6 han continuado y cumplen el tiempo del criterio de inclusión. No todas han conservado su relación de pareja o mantenido vida sexual activa.

Realizamos estadística descriptiva y el análisis del cambio intrasujeto (pre-post tratamiento) se ha realizado con el Test T de Student para datos pareados. Las pruebas estadísticas fueron de dos colas con un IC del 95%.

Se realizan **cuestionarios de FSM y FSFI** para valorar la mejoría de las disfunciones sexuales, Deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción y dolor (FSFI) y dolor, penetración y ansiedad.



RESULTADOS

Presentamos los resultados de los cuestionarios mejorados entre un 1,33 y un 8% y de forma global casi un 4%

CONCLUSIONES:

Debemos ser proactivos para mejorar la calidad de vida y la salud sexual de las pacientes oncológicas, especialmente en el cáncer de cérvix por sus especiales connotaciones. El **ospemifeno** es una opción terapéutica en pacientes sin radioterapia, y parece que en nuestro estudio también conseguimos buenos resultados tras la misma. Sería deseable realizar estudios más amplios teniendo en cuenta algunas de estas consideraciones