

NEOPLASIA INTRAEPITELIAL CERVICAL II ASOCIADA A VPH Y CARCINOMA ESCAMOSO DE BOCA CONCOMITANTE. A PROPÓSITO DE UN CASO

María Marqués Rodríguez, Alba González Sevilla, Maite Cortés Antolín, Vega Garijo Cruz, Andrea Gutiérrez Landaluce, Gloria Paz Martínez Ramón.

ANTECEDENTES/OBJETIVOS

El virus del papiloma humano (HPV) se considera agente causal del cáncer de cérvix, sin embargo, una pequeña proporción del cáncer de cérvix es negativo en VPH. El HPV también está asociado al cáncer de vagina, vulva, cabeza y cuello; implicando en estos un mejor pronóstico respecto a los HPV independientes.

RESULTADOS

Mujer, 28 años, resultado de citología L-SIL y VPH negativo.

AP.

- Psoriasis cutánea.
- Nuligesta. Vacunación completa del VPH. Utiliza preservativo. Fumadora

PLAN.

- Abandono del hábito tabáquico + Control Junio 2023 con Co-Test.

**Control Junio
2023**

CONCLUSIONES

No se ha establecido si los carcinomas VPH negativos en el cuello uterino son un subconjunto distinto de tumores con diferente comportamiento epidemiológico y biológico, o si representan resultados falsos negativos de las técnicas de detección VPH.

Tampoco existe evidencia que demuestre que estos tumores tengan características clínicas y pronósticas diferentes.

MATERIAL Y MÉTODOS

Presentamos el caso de una paciente con neoplasia intraepitelial cervical grado II HPV negativo y carcinoma escamoso de suelo de boca concomitante.

Carcinoma del suelo de la boca HPV negativo.

IQ. glossectomía parcial del vientre lingual y del suelo de la boca derecha.

AP. Carcinoma escamoso G2 pT2p N0, margen inferior a 2mm, invasión perineural.

Se descarta invasión linfática y a distancia.

Se administra radioterapia adyuvante.

Exploración en consulta.

-Colposcopia: ZT 1 epitelio lugol negativo que impresiona de impresiona de zt congénita. Biopsia a las 12 h

-Citología: L-SIL

-HPV: No se detecta

-Bx cérvix 12 h: CIN II + tinción positiva para p16.

Se programa para Conización y legrado endocervical.

AP.

- Conización: CIN 1 con metaplasia escamosa inmadura y márgenes quirúrgicos libres.
- Legrado endocervical: Endometrio proliferativo.