

1315 CONIZACIONES REALIZADAS EN UN CENTRO DE 3r NIVEL ENTRE 2003-2023 EN BARCELONA



Núria Prat Olivé, Eduardo González Bosquet, Ana Lucia Contreras, Aida Diaz, Maria-Dolores Gómez Roig

Cohorte descriptiva de 1315 pacientes sometidas a conización por lesiones cervicales, 20 años de experiencia. Variables analizadas: biopsia post conización, colposcopias, AP resultados. Se recomendó la vacuna para VPH.

RESULTADOS	BIOPSIA POSTCON.	LAC POSTCON.	RECONIZACIONES	HISTERECTOMIA
MARGENES AFECTOS (590) 304 pacientes con colposcopia patológica que se biopsia	59 HSIL 87 LSIL 32 otros ¹ 126 biopsia negativa 286 no biopsia	1 Ca Escamoso 26 HSIL 37 LSIL 13 ASCUS 6 otros ¹ 497 normal	107: 2 Ca Escamoso 44 HSIL 40 LSIL 12 no resultado ³ 9 negativas	105: 14 Cáncer ² 45 HSIL 17 LSIL 10 no resultado ³ 19 negativas
MARGENES NO AFECTOS (725) 50 pacientes con colposcopia patológica que se biopsia	41 HSIL 49 LSIL 13 otros ¹ 574 no biopsia	25 HSIL 37 LSIL 18 ASCUS 1 otros ¹ 645 normal	20: 7 HSIL 6 LSIL 4 no resultado ³ 3 negativas	43: 7 Ca Escamoso 15 HSIL 6 LSIL 1 atíпия 12 negativas

¹ VAIN, Atíпия, pólipos | ² Adenocarcinoma, Carcinoma Escamoso | ³ pérdidas de seguimiento

CONCLUSIONES La afectación de márgenes es un factor de mal pronóstico, ya que observamos mayor detección de lesión invasora, con mayor necesidad de tratamientos, como reconizaciones o histerectomía. En pacientes de bajo riesgo se podría aceptar el seguimiento aunque con control estrecho.