

LIQUEN ESCLEROSO VULVAR EN LA NIÑEZ: LA REALIDAD IGNORADA

Jamal-Ismail Ortiz, S; Zambruno Lira, AM; Sánchez González, MJ; Montes de Oca González, S; Ortiz Serrano, M; Serrano Romero, RM
Hospital Universitario Jerez de la Frontera

OBJETIVOS: Conocimiento actual del LEV en la niñez, diagnóstico diferencial en este pico de edad y tratamiento.

MATERIAL Y MÉTODOS: Revisión de la literatura y guías clínicas acerca del liquen escleroso vulvar centrado en la infancia.

RESULTADOS Y CONCLUSIÓN:

LEV es una dermatosis que afecta principalmente a la zona urogenital femenina y parece estar relacionada con factores genéticos, hormonales y autoinmunes. Aparece clásicamente en la perimenopausia, aunque presenta un pico de frecuencia en prepúberes.

Síntomas más frecuentes: prurito, cambios en coloración y morfología de genitales externos, pérdida de elasticidad, disuria, dispareunia. En la infancia comparte algunos de estos, y destaca además el estreñimiento y presencia de petequias y hematomas.



Diagnóstico diferencial: liquen plano, liquen simple crónico, ITS, neoplasia vulvar, dermatitis de contacto, psoriasis, vitíligo, entre otras. En la niñez es obligado descartar abusos sexuales, oxiuros, cuerpo extraño en vagina.

El diagnóstico es fundamentalmente clínico, precisando biopsia cutánea para confirmación histológica excepcionalmente. Además, realizarlo de forma precoz es clave para un inicio rápido del tratamiento, evitando así la alteración de genitales irreversible.

El tratamiento en ambos picos de edad se basa principalmente en corticoterapia, difiriendo entre ambos grupos en el tiempo e intensidad de su uso.