

LESIÓN VULVAR A FILIAR EN MUJER DE 91 AÑOS: A PROPÓSITO DE UN CASO

Franco Pire L.; Ruano Rodríguez L.; Calvo Torres J.; De la Torre Serrano M.; Ramírez Mena M.; Bellón del Amo M.

Caso clínico

Presentación clínica


Mujer de 91 años, sin antecedentes de interés, que consulta por una lesión ulcerada en labio mayor derecho de 3 años de evolución que sangra al roce. Ante la alta sospecha de neoplasia vulvar se deriva a la unidad de Tracto genital inferior donde se biopsia la lesión y se solicitan estudios diagnósticos.

Pruebas complementarias

RMN	Tumoración vulvar derecha de 30 x 8 x 33 mm, sin afectación de estructuras adyacentes ni adenopatías
Marcadores tumorales	CEA 125, cifra 21.1, SCC normales
Biopsia	Carcinoma basocelular vulvar

Tratamiento

Se realizó exéresis de la lesión con márgenes de seguridad, con buena recuperación posterior y sin recaídas hasta este momento.



Conclusiones

El carcinoma basocelular es el tipo histológico más frecuente de los cánceres de piel pero suele aparecer en regiones fotoexpuestas como la cabeza y el cuello. Su presentación en el área genital es prácticamente excepcional y supone menos del 2% de las neoplasias malignas vulvares. Esto, puede inducir a errores en el diagnóstico y tratamientos inadecuados.

Se trata de un tumor de crecimiento lento y alta tasa de recurrencia por lo que es importante realizar un tratamiento precoz y adecuado que mejore el pronóstico de las pacientes.