

ESTUDIO DE CORRELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO CITOLÓGICO Y EL RESULTADO HISTOLÓGICO DE LA BIOPSIA DE CUELLO DE ÚTERO

Leyre Marco Sanz, Henar Sánchez Quirós, Teodora Alonso Gutiérrez, María Carrillo Sánchez, Marta Robles Gaitero, Yolanda Pérez Martínez.
Hospital Universitario de Burgos. Burgos

OBJETIVOS

Evaluar la concordancia de la citología con el resultado histológico de la biopsia realizada tras el examen colposcópico en pacientes conizadas de 2019 a 2023. La finalidad del mismo es analizar nuestros datos y realizar un control de calidad interno.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional retrospectivo en un total de 308 pacientes sometidas a una conización en el Hospital Universitario de Burgos de 2019 a 2023.

RESULTADOS

La media de edad fue de 41 años, un 81,2% derivadas del cribado. 292 pacientes fueron positivas para VPH el 94,1% presentaban un serotipo de alto riesgo (51,6% VPH 16). 20,4% presentaban una citología negativa con prueba VPH positiva, de ellas el 79,6% tenían una lesión de alto grado en el resultado de la biopsia y 2 pacientes presentaron un adenocarcinoma in situ. 38 pacientes con **ASC-US**, de estas el 97% presentaron una lesión de alto grado en la histopatología tras la biopsia colposcópica. 26 pacientes presentaban **ASC-H**, en 19 se confirmó la lesión de alto grado. Analizando la concordancia de la citología con la biopsia encontramos que de 104 pacientes con HSIL, no se encontró concordancia en un 15,4% y de 31 mujeres con LSIL, en el 87,1% no se encontró concordancia con el resultado de la biopsia.

CONCLUSIONES

Alta participación en el programa de cribado. En general se encontró una buena concordancia para lesiones de alto grado. Es importante que no existan discrepancias severas en los casos de HSIL para un buen control de calidad. Los casos de adenocarcinoma in situ con citología negativa son escasos. Debemos mejorar la cifra de pacientes con citología negativa y lesión de alto grado en la biopsia.