

Factores de riesgo que afectan al correcto seguimiento postconización de las pacientes del Hospital Virgen de las Nieves

Lucía Iglesias Linares, Rebeca Benito Villena, Laura Revelles Paniza, Sandra García Castellanos, Marina Espejo Romero, María Ángeles Calderón Rodríguez

Objetivos:

Tras una conización por un HSIL la probabilidad de persistencia o recurrencia existe. El riesgo de presentar una nueva lesión de alto grado en mujeres tratadas es del 5% y el de cáncer de cérvix es 3-12 veces mayor que la población general. Por ello, es importante un correcto seguimiento postconización. El objetivo de este trabajo fue evaluar posibles factores de riesgo que puedan interferir en el correcto seguimiento postconización a los 6 y 12 meses de esta.

Material y métodos:

Se diseñó un estudio observacional, retrospectivo y transversal realizado en la Unidad de Patología Cervical del HUVN [2017-2021] en pacientes con lesiones cervicales de alto grado sometidas a conización, excluyendo aquellas pacientes con resultado de carcinoma. Se registraron las variables de edad, vacunación de VPH pre y postconización, tabaquismo, nº cigarrillos/día, seguimiento a los 6 y 12 meses y presencia de VPH a los 6 meses. Se empleó estadística descriptiva (medias, frecuencias y porcentajes) para las variables cuantitativas y categóricas respectivamente. Se realizó el test Chi-cuadrado para evaluar el grado de influencia de factores como la edad, tabaquismo, vacunación previa o posterior a la conización en relación a la falta de seguimiento a los 6 y 12 meses de esta ($p < .05$ como estadísticamente significativo).

Resultados:

Se monitorizó una muestra de 494 pacientes (edad media: $38,9 \pm 9$ años). Un 25,9% (N=128) presentó un seguimiento inadecuado a los 6 y/o 12 meses, 7,9% y 18% respectivamente. De este grupo, el 76,1 % no presentaron vacunación previa a la conización. La tasa de vacunación postconización es del 58,7%. El 55,4% eran fumadoras, siendo el 21,7% de >10 cigarrillos/día. Se estratificó la edad en tres categorías (25-35, 26-45 y >45). No se observó relación entre los diferentes grupos de edad y la falta de seguimiento a los 6 y/o 12 meses ($p > .05$). Tampoco se encontró una relación estadísticamente significativa entre VPH + a los 6 meses postconización y la falta de seguimiento a los 12 meses. Si se ha visto relación estadísticamente significativa ($p < 0,05$) entre las fumadoras y la falta de seguimiento a los 6 meses postconización.

Conclusiones:

Hasta un 25% de nuestras pacientes presentan un seguimiento incompleto postconización. Las fumadoras presentan una mayor tasa de abandono a los 6 meses. Globalmente, el incumplimiento es mayor a los 12 meses (18%). Ante estos resultados se podrían implementar hojas informativas orientadas a futuras pacientes para poner en conocimiento la frecuencia e importancia de las revisiones.




Figura 1. Porcentaje de pacientes con un seguimiento postconización adecuado e inadecuado