

CONDILOMATOSIS VULVAR EXTENSA. A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO

Bello Pérez, JC; Sánchez-Pinto Hernández, C; García Vázquez, E;

Arbelo Pérez, P; Preckler Peña, D, Quesada López-Fe, A.

Paciente de 72 años que acude por **leucorrea fétida**. Obesidad III, Dislipemia, Hipertensión Arterial. G1P1A0. Menopausia 50 a.

- Exploración: **Placa blanquecina de unos 3x4cm que abarca todo el labio menor derecho** desde introito hasta meato uretral, estenosis vaginal. Se realiza **punch**.
- Tacto vaginal sin lesiones aparentes.
- Eco TV: útero en extensión, sin hallazgos.

INTRODUCCIÓN

Los condilomas anogenitales son la manifestación clínica de la infección VPH y aproximadamente el 90% están asociados con los serotipos 6/11. Se manifiesta en forma de pápulas sobreelevadas aisladas o incluso formando placas, de tamaño y forma variable. Suelen ser asintomáticos, pero pueden provocar prurito, dolor o sangrado. En casos seleccionados, se puede tratar mediante tratamiento médico, con controles estrictos para valorar evolución y efectos secundarios. Para pacientes con enfermedad extensa y/o voluminosa, se suele optar por cirugía.

En caso de pacientes de edad avanzada, es fundamental la realización de un **diagnóstico diferencial** puesto que la incidencia de cáncer de vulva presenta un pico máximo de incidencia entre los 60-80 años. Suele manifestarse de forma asintomática y se suele presentar como lesión única ulcerada, placa o masa vulvar.



EVOLUCIÓN

AP: SIN SIGNOS DE MALIGNIDAD.

- Dada la alta sospecha se realiza nueva biopsia: **Condiloma acuminado (LSIL)**. Debido a la extensión se propone para exéresis, pero pierde seguimiento. A los 5 meses acude nuevamente con diagnóstico de Linfoma NH estadio IV.

- Exploración: **lesión muy amplia condilomatosa que abarca todo el labio menor derecho y se introduce hasta vagina, desde introito hasta uretra**. Debido al recién diagnóstico, no desea cirugía por el momento.



CONCLUSIÓN

La presencia de condilomatosis vulvar en pacientes de estas edades es muy poco frecuente. En este sentido es recomendable, en este grupo de pacientes con lesiones verrucosas extensas o de crecimiento progresivo, la realización de una biopsia previo a la instauración del tratamiento.