

Citologías de carcinoma y adenocarcinoma. Revisión de casos de 2015 a 2023

Sanz Baro R, Alonso Laza C,, Pineda Domínguez L, Ferreira Borrego I. Fundación Jiménez Díaz. Madrid

Objetivos

El cribado ha permitido reducir la incidencia y la mortalidad de cáncer de cérvix en más de un 70%. El objetivo es analizar los infrecuentes casos de citología de carcinoma y adenocarcinoma diagnosticados en nuestro hospital.

Material y métodos


Se han revisado los diagnósticos citológicos entre 2015 y 2023 en la Fundación Jiménez Díaz y recogido 11 casos de citología con resultado de carcinoma escamoso y tres de adenocarcinoma.

Caso clínico

De las 11 pacientes con citología de carcinoma escamoso, 8 presentaban un cáncer clínico en la biopsia directa, una en la biopsia guiada por colposcopia y 2 se sometieron a conización. 2 de las 11 pacientes fueron sometidas a cirugía radical como tratamiento primario.

De las 3 pacientes con citología de adenocarcinoma, una fue diagnosticada de adenocarcinoma endometrial y las otras dos, un cáncer de cérvix. Una de ellas se sometió a cirugía y la otra a tratamiento paliativo.

Tipo de tumor y estadio



Conclusiones

La citología de carcinoma es poco frecuente y habitualmente corresponde a cánceres en estadio clínico.