

ESTUDIO SOBRE LA INFLUENCIA DE LA AFECTACIÓN GANGLIONAR EN EL PRONÓSTICO DEL CÁNCER DE VULVA INFILTRANTE

Carlota Ramos Romero¹, Ana Belén Cuesta Cuesta¹, Natalia del Socorro Sánchez², Eugenio Gallego-Casilda Gallego¹, Karen Pilar Reyes Palomino¹, Rosario Noguero Meseguer¹

¹ Hospital Universitario Rey Juan Carlos ² Universidad Rey Juan Carlos

OBJETIVOS

Analizar la evolución de las pacientes con cáncer de vulva y comprobar si el estado ganglionar influye en la supervivencia como describe la literatura.

MÉTODOS


Análisis de supervivencia entre mujeres con cáncer de vulva diagnosticadas y tratadas en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos entre los años 2012 y 2023.

Se realizó una estimación Kaplan-Meier de la curva de supervivencia en ambos sub-grupos de pacientes mencionados con cáncer de vulva. La asociación entre las variables cualitativas se ha realizado con el test de X².

CONCLUSIONES

La mediana y media de supervivencia en pacientes con afectación ganglionar fue menor a la de aquéllas sin ganglios afectados.

RESULTADOS



Afectación ganglionar	Media	Mediana
pN0	5,723	6,516
pN1	4,235	1,418