

Efecto del *Coriolus versicolor* en el proceso de reepitelización postconización. A propósito de un caso.

Álvarez Gil, C. (Hospital Universitario Jerez de la Frontera) ; Sanmartín Salinas, P (Procare Health); López Hernández, C. (Hospital Universitario Jerez de la Frontera)

ANTECEDENTES

La complicación más frecuente asociada a la conización cervical es el sangrado. Se presenta un caso clínico para evaluar el efecto de un gel vaginal a base de *Coriolus versicolor* en la reepitelización del cuello uterino, en una paciente sometida a una conización. Se comparó la evolución postconización con un caso control de similares características, pero sin tratamiento tópico.


MATERIAL Y MÉTODOS

La paciente número 1 tenía 35 años y la paciente número 2, 28. Ambas sin antecedentes médicos relevantes. En el momento de su visita inicial, las dos presentaron positividad para VPH, citología HSIL y HSIL (CIN2-3) en la biopsia. Fueron sometidas a una conización con asa diatermia. Posteriormente, en ambos casos, se realizó hemostasia mediante electrocoagulación. Tras el procedimiento, ambas pacientes recibieron las mismas pautas: mantener reposo, abstenerse de tener relaciones sexuales y evitar baños de inmersión o el uso de tampones durante dos semanas. Sin embargo, a la paciente 1 también se le indicó la aplicación de un gel vaginal a base de *Coriolus versicolor* (una cánula diaria durante 21 días), mientras que a la paciente 2 no se le administró ningún tratamiento tópico.


RESULTADOS

Ambos pacientes fueron reevaluadas 21 días después de la conización.

La paciente 1 mostró buena reepitelización cervical, y no refería haber tenido episodios de sangrado desde la intervención.



En la paciente 2 se observó tejido de granulación y sangrado durante la exploración del cuello uterino. Además, comentó spotting continuo desde la conización, que uno de los días se tornó más abundante y requirió una visita a urgencias, resolviéndose con medidas conservadoras.



CONCLUSIONES

No existe consenso para la terapia posconización con tratamientos tópicos. Sin embargo, la aplicación de un gel vaginal a base de *Coriolus versicolor* podría representar una ventaja clínica como tratamiento adicional al manejo estándar posconización de las pacientes.