

Estudio epidemiológico del VPH en pacientes conizadas previamente vacunadas en el Hospital Virgen de las Nieves.



Andrea Gallardo Vera, Rebeca Benito Villena, Laura Revelles Paniza, Sarah Domingo Piñar, Judit Serón Navas, María Ángeles Calderón Rodríguez.

OBJETIVOS

Cuantificar y clasificar los tipos de VPH AR detectados en pacientes que han precisado conización y estaban previamente vacunadas contra el VPH (en España se inició en 2008 a nacidas entre 1994-1995).

MATERIAL Y MÉTODOS


Estudio observacional descriptivo sobre VPH AR en pacientes conizadas entre 2017-2022 en la UPTGI, vacunadas contra el VPH. Se realizó un subgrupo de pacientes nacidas tras 1994 y su causa de vacunación.

CONCLUSIÓN

Los tipos de VPH AR más prevalentes en las pacientes vacunadas estudiadas son el 16, 31 y 33. La mayoría de las pacientes se vacunó fuera de calendario, aproximadamente la mitad por alteraciones citológicas previas.

RESULTADOS

- Solo estaban vacunadas **37** de las 512 pacientes conizadas (6'2%).
- Edad media **34 años** (rango 24-47 años).
- Fumadoras el 32'4%, >10cig/día el 50%.
- Se determinó el VPH al 62'2%, solo un resultado negativo, resto positivos:



VPH AR único	VPH AR múltiple	VPH AR total
16 (35'7%)	16 (50%)	16 (36'4%)
31 (21'4%)	51 (33'3%)	31 (18'2%)
33 (14'3%)	18, 33, 52, 53, 58, 59 (16'7% resp.)	33 (16'6%)
35, 52, 56, 78 (7'1% respectivamente)		51, 52, 58 (9% resp.)
		18, 35, 53, 56, 59 (4'5% resp.)

- Solo 3 pacientes fueron vacunadas según calendario, de las demás el 51'4% se vacunó por alteraciones citológicas previas y en el 40'5% no se especificó la causa.