

"Estudio de la evolución de los casos de LLETZ a lo largo de los años."

Vázquez del Campo, A.¹; De Castro Momoitio, A.¹; ; Erasun Mora, D.² Alcantud García, A.¹; Vega Álvarez, A.¹; Juncal Ruíz, E.¹

¹Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

²SCS/IDIVAL



OBJETIVOS

El objetivo del presente estudio es estudiar la evolución de los LLETZ realizados durante los últimos años en nuestro medio hospitalario.

RESULTADOS


El número mayor de técnicas realizadas fue el inicio, en el año 2016 (151), y el menor el 2020 (98), probablemente en relación a la pandemia COVID19. En 2022 se realizaron 117.

La indicación de tratamiento sin biopsia previa en el año 2016 fue del 9.27%, mientras que en el año 2022 disminuyó al 5% progresivamente, sin ser estadísticamente significativo. El porcentaje de lesiones causadas por los serotipos 16/18 no ha presentado variaciones significativas a lo largo de los años, oscilando entre el 45 y el 60% aproximadamente.

En relación a los resultados en pieza de conización, vemos más lesiones de bajo grado (citopáticas y CIN I) en los años 2017 y 2018 y menos en 2020 (13%). La tasa de fumadoras se ha mantenido estable, en torno al 40% en toda la muestra y la tasa de vacunación ha sufrido un claro aumento (del 11% en 2016 al 80% en 2022 y 2023).

MATERIAL Y MÉTODO

Análisis retrospectivo de una muestra de 877 técnicas escisionales ambulatorias, desde el año 2016 hasta Junio de 2023. Se han analizado múltiples variables como el número de procedimientos, la edad de las pacientes, el tipo de alteración citológica subyacente, el serotipo viral, la toma de biopsias preescisionales y su resultado, el volumen escisionado, el tipo de lesión en la pieza de conización, la tasa de aclaramiento viral y el porcentaje de mujeres fumadoras y vacunadas de la muestra. El análisis descriptivo y estadístico se ha realizado mediante el software IBM SPSS Statistics.



Descenso progresivo en el número de lletz en <35 años ($p < 0.05$)

CONCLUSIONES

El relevo generacional de los últimos años en nuestro medio podría justificar una tendencia más conservadora, sobre todo en mujeres menores de 35 años, el mayor ajuste a los estándares de calidad y el aumento de la cobertura vacunal.