

Resultados del tratamiento de lesiones precursoras de vulva y vagina mediante Vaporización LASER de CO2

Centeno C, Bradbury M, Acosta U, Valles E, Perez-Benavente A, Gil A. Hospitals Vall d'Hebron. Universitat Autònoma Barcelona

Objetivo:

Analizar los resultados del tratamiento mediante vaporización laser de CO2 de lesiones precursoras de vulva y vagina en el periodo 2020-2022 en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

Resultados:


HSIL vaginal Edad media 57
inmunosupresión 33%
tiempo seguimiento: 19 meses

HSIL vulvar Edad media 52
inmunosupresión 46%
tiempo seguimiento: 16 meses.


Material y Métodos:

Se trataron 27 HSIL vag y 28 HSIL vul.
Exploración de cérvix-vagina-vulva.
Antecedente de inmunosupresión.
Lesión persistente: lesión presente en primer control post tratamiento.
Recurrencia: aparición de una nueva lesión histológica tras al menos un primer control negativo.
Test Chi cuadrado para estudiar asociación fallo tratamiento/inmunosupresión.


Enfermedad Multicéntrica %:



HSIL vaginal



HSIL vulvar



■ Persistencia % ■ Recurrencia %

Conclusiones:

El 80% de HSIL vulvar y 90% HSIL vaginal son enfermedades multicéntricas. El 33 y 46 % respectivamente se asocian a inmunosupresión, pero no se asoció al fallo de tratamiento. La vaporización laser trató con éxito un 60-65% de los casos. Se requiere un seguimiento periódico.