

DERMATOSIS INFLAMATORIAS DE LA VULVA: REVISION DE 178 CASOS



Amina Lubrano Rosales¹, Raquel Díaz Calvo¹, Ana belén Virseda Lopez¹, Miguel Andujar Sánchez², Elena Cortes Cros¹

¹ Servicio de Obstetricia y Ginecología. ² Servicio de Anatomía Patológica. Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil (CHUIMI). Las Palmas de Gran Canaria.

INTRODUCCION

Las dermatosis inflamatorias de la vulva constituyen un motivo frecuente de consulta en la práctica clínica asistencial que afecta significativamente la calidad de vida de las pacientes. Sin embargo, con relativa frecuencia, el diagnóstico correcto de una lesión vulvar es tardío y ocurre después de que la paciente haya realizado múltiples consultas. Existe una asociación entre algunas dermatosis y el cáncer de vulva; de ahí, la importancia de su identificación y seguimiento.

El objetivo de este trabajo fue realizar un estudio epidemiológico de las dermatosis vulvares y conocer la evolución de estas pacientes en nuestro centro.

MATERIAL Y METODO

Estudio observacional retrospectivo de 178 dermatosis vulvares diagnosticadas mediante biopsia en el Servicio de Obstetricia y Ginecología del CHUIMI de Las Palmas de Gran Canaria entre Junio 2015 a junio 2022 .

RESULTADOS

	Liquen escleroso	Liquen simple crónico	Liquen plano	Total
n	112 (62,9%)	55 (30,3%)	11 (6,8%)	178 (100%)
E. media(años)	61,27	61,14	65,63	62,68
Diabetes	24	8	3	35
E.Tiroidea	6	6	-	12
Alopecia	3	2	-	5
vitiligo	1	1	-	
Prurito	74	42	9	125(70,2%)
Dolor	8	4	-	12(6,7%)
L.Vulvar	30	9	2	41 (23,1)
Tiempo medio (meses)	31,41	25,2	28,18	28,26
Corticoides	80	40	9	129(72,4%)
Estrógenos	20	11	1	32(17,9%)
Emolientes	12	4	1	17 (9,5%)
Vin3/ Ca Vulva	5	0	1	6 (3,37%)

◆ El tiempo medio en buscar atención médica por primera vez fue de 28,3 meses (1-288 meses).

◆ 6 pacientes (3,37%) evolucionaron a VIN3 o Carcinoma escamoso de vulva. La edad media de estas pacientes fue estadísticamente mayor que el grupo que no evolucionó a patología neoplásica (74,4 años vs 61,46) con una $p < 0,001$.

CONCLUSION

El seguimiento de estas pacientes deben ser a largo plazo por su posible progresión a cáncer vulvar, sobre todo en las mujeres de mayor edad.