

Mejora en los resultados de los márgenes libres con la conización bajo control ecográfico.


Medina Buzón, IC., Jamal-Ismael Ortiz, S., Gomar Crespo, A., Álvarez Gil, Carmen, López Hernández, C.

•Objetivos:

El tratamiento de las lesiones cervicales bajo control colposcópico permite eliminar la lesión con márgenes de seguridad adecuados y reduce las escisiones de tejido excesivas. Con nuestra revisión hemos querido ver si nuestros resultados se asemejan con lo ya descrito en la literatura y poder sacar las conclusiones que nos ayuden a mejorar en la práctica clínica diaria.

•Material y métodos:

Realizamos una revisión del total de conizaciones ambulatorias realizadas en el Hospital de Jerez de la Frontera durante el año 2022. Recogimos los datos correspondientes al uso de colposcopia y la afectación de márgenes que presentaban las piezas.



•Conclusiones:

Según el estudio descriptivo de nuestros datos, parece que son concordantes con lo que dice la literatura sobre la mejora en la afectación de márgenes tras la conización bajo control ecográfico. Pero sería necesario realizar estudios analíticos sobre dichos datos para llegar a conclusiones más firmes.

•Tras la revisión de nuestros datos, se realizó una reunión multidisciplinar junto a anatomía patológica para implementar medidas que hagan mejorar nuestros resultados, cosa que está haciendo que los datos preliminares de 2023 estén mejorando considerablemente.