

Estudio epidemiológico del VPH en pacientes conizadas sin vacuna previa en Hospital Virgen de las Nieves.



Andrea Gallardo Vera, Rebeca Benito Villena, Laura Revelles Paniza, Sarah Domingo Piñar, Jesús Martínez Moya, María Ángeles Calderón Rodríguez.

OBJETIVOS

Cuantificar y clasificar los tipos de VPH AR detectados en pacientes que han precisado conización y que previamente no estaban vacunadas frente al VPH.

MATERIAL Y MÉTODOS


Estudio observacional descriptivo sobre VPH AR en pacientes conizadas entre 2017-2022 en la UPTGI no vacunadas previamente frente al VPH.

CONCLUSIÓN

Los tipos de VPH AR más prevalentes en pacientes no vacunadas son con gran diferencia el 16 y el 31, quedando el 18 muy por debajo. Esto es de interés en la elección de vacuna contra el VPH en nuestra población (solo la vacuna nonavalente inmuniza frente a VPH 31).

RESULTADOS

- No estaban vacunadas **556** de las 592 pacientes conizadas (93'9%).
- Edad media **39 años** (rango 20-68 años).
- Fumadoras el 46'2%, >10cig/día el 50'6%.
- Se determinó el VPH al 59'5% de las pacientes



VPH AR único	VPH AR múltiple	VPH AR total
16 (44'4%)	16 (55'4%)	16 (45'8%)
31 (15%)	31 (35'9%)	31 (20'5%)
52, 33, 58, 18, 45, 39, 35, 51, 56, 66, 68, 73, 82, 42, 53 (<10% respectivamente)	51, 52 (14'1%)	52, 33, 58, 18, 51, 45, 56, 39, 35, 66, 68, 73, 82, 53, 59, 42, 48 (<10% resp.)
	33 (12%)	
	18 (10'9%)	
	45, 56, 58, 35, 39, 59, 53, 66, 68, 73, 82, 48 (<10% resp.)	