

Manejo del Paget vulvar. Revisión de casos

Sanz Baro R, Alonso Laza C, Ferreira Borrego I, Pineda Domínguez L. Fundación Jiménez Díaz. Madrid

Objetivos, material y métodos

La enfermedad de Paget vulvar supone aproximadamente el 1-2 % de las neoplasias vulvares y es la localización más frecuente de la enfermedad de Paget extramamaria. A pesar de su alta tasa de recidivas tiene muy buen pronóstico. La cirugía es el estándar de tratamiento pero se han desarrollado opciones conservadoras médicas y quirúrgicas. El objetivo del trabajo es evaluar el tratamiento y pronóstico de las 11 pacientes tratadas en nuestro hospital entre 2016 y 2023.

Resultados

La media de edad de las pacientes fue de 75 años, con 4 a 7 años de seguimiento.

El tratamiento inicial fue cirugía en 6 pacientes e imiquimod en 5. 7 pacientes recidivaron, 4 tratadas inicialmente con cirugía y 3 con imiquimod. De las 4 pacientes que no presentaron recidiva, 1 recibió tratamiento sintomático, 1 cirugía y 3 imiquimod.

Como tratamiento de la recidiva, de las 4 pacientes tratadas con cirugía, 2 de recibieron tratamiento con imiquimod, una con 5-Fluorouracilo + calcipotriol y otra con una combinación de imiquimod, 5-Fluorouracilo + calcipotriol, y terapia fotodinámica en las sucesivas recidivas. De las 3 pacientes tratadas inicialmente con imiquimod que recidivaron, una se rescató con cirugía y dos con nuevos ciclos de imiquimod. Sólo una paciente presentó progresión.



Conclusiones

La enfermedad de Paget vulvar es poco frecuente. Con frecuencia requiere tratamientos múltiples por su alta tasa de recidiva.