

CÁNCER DE CÉRVIX EN GESTANTE DE 33 SEMANAS: A PROPÓSITO DE UN CASO



García García A, Morales López L, Coronado Martín PJ, Morales Taboada FG, Bellón del Amo M, Ramírez Mena MM.

Servicio de Ginecología y Obstetricia. Instituto de Salud de la Mujer. Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Objetivo

Se presenta el caso de un cáncer de cérvix diagnosticado durante la gestación

Caso clínico

Mujer de 32 años, gestante de 33+5 semanas con control gestacional extraclínico remitida a nuestro centro en agosto 2023 por sospecha de cáncer de cérvix.

Cribado previo (noviembre 2022): **ASC-H y VPH 18**, sin evaluación colposcópica posterior. La paciente no acudió a para recoger estos resultados.

En semana 33 de gestación consulta por metrorragia escasa.

Exploración (Figuras 1 y 2). Por tacto vaginal ambos parametrios están libres.




Figura 1 y 2. Evaluación colposcópica

Se toman varias biopsias que se remiten de forma preferente a Anatomía Patológica y se solicita resonancia magnética preferente.

Tabla 1. Pruebas complementarias

Resonancia magnética	Tumoración cervical de 2.5 cm compatible con lesión invasora. No afectación parametrial. No adenopatías. <u>Juicio clínico:</u> Carcinoma de cérvix IB2 radiológico IB3 clínico.
Anatomía patológica	Carcinoma epidermoide infiltrante moderadamente diferenciado.

Evolución:

Gestante de 34+6 semanas, se realiza **cesárea programada** obteniendo una recién nacida viva de 2130 gramos, con buenos signos de vitalidad. La intervención transcurre sin incidencias.

En el momento actual, la paciente se encuentra a la espera de la realización de pruebas complementarias (**resonancia magnética, PET-TAC y marcadores tumorales**) para decidir abordaje terapéutico




Figura 3. Resonancia magnética

Conclusión

La gestación es un momento excelente para revisar y actualizar la historia de cribado de cáncer de cuello uterino y debe realizarse preferiblemente en el primer trimestre de gestación. En este caso, disponer de los últimos resultados del cotest habría permitido la evaluación colposcópica y probablemente el diagnóstico de cáncer de cuello uterino de forma precoz.