

ENFERMEDAD DE PAGET VULVAR : PRESENTACIÓN DE CUATRO CASOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA



Leal Carro C, Losa Puig H, Vázquez Caamaño P, Porto Quintáns M, Gil Andrés M, Valenzuela Besada O
Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo. Pontevedra.

ANTECEDENTES

Enf. de Paget extramamaria (EPEM) → 1% de los cánceres vulvares
Tasas de supervivencia a los 5 años → 72%.
Tratamiento NO protocolizado en guías clínicas
→ opción más empleada: cirugía
Recurrencias elevadas (21 al 60%)

MATERIAL Y MÉTODOS


Estudio observacional, retrospectivo y descriptivo

- Inclusión: Pacientes dx de EPEM de 2018-2023 en Ud. Patología Cx del H. Álvaro Cunqueiro → **total de 4 pacientes.**
- Datos recogidos:
 - Síntomas y signos **diagnósticos** así como **edad** de presentación
 - Tratamiento empleado y edad de la paciente
 - Seguimiento y valorar si hubo recidivas

Tratamiento qx

RESULTADOS

- 40, 66, 74 y 79 años al diagnóstico



CONCLUSIONES

- EPEM → infrecuente, con alta tasa de supervivencia
- Alta tasa de recidivas aún con márgenes negativos
- Necesidad de **individualizar** los tratamientos
 - **Evitar realizar cirugías mutilantes** en gente joven
 - Valorar Imiquimod tópico ó Cirugía de Mohs para evitar ser tan agresivos en la cirugía sin renunciar a la búsqueda de la curación de la enfermedad