

PÓLIPO FIBROEPITELIAL VAGINAL. A PROPÓSITO DE UN CASO

Cabrero Segurado MA; Bustillo Alfonso S; de Marino Caba M; Costas Rodríguez T; Martín Esquilas M; Sancho de Salas V.

ANTECEDENTES/OBJETIVOS:

Tumoración benigna
Sangrado vaginal vs asintomática
Incidencia desconocida

FACTORES DE RIESGO:

- Tratamiento hormonal
- Obesidad
- Tabaquismo
- VPH



CONCLUSIONES:

Necesario el planteamiento de un diagnóstico diferencial con:

IMPORTANTE
EXÉRESIS COMPLETA
Y ANÁLISIS
MINUCIOSO

MATERIAL Y MÉTODOS:

Mujer 65 años; intervenida de histerectomía + DA por útero polimiomatoso
Acude a urgencias por sangrado vaginal + bultoma
En tratamiento con estrógenos vaginales por atrofia y dispareunia

RESULTADOS:

Exéresis con bisturí bajo anestesia con mepivacaína 2% y doble ligadura

AP:

PÓLIPO FIBROEPITELIAL VAGINAL



RABDOMIOSARCOMA BOTRIOIDE

- Aspecto en "racimo de uvas"
- Incidencia <1%
- Manejo multimodal QT/RT

NEOPLASIA VAGINAL INTRAEPITELIAL (VAIN)

- Placas acetoblancas
- Test de Schiller positivo
- Asociadas a CIN/VIN