

Analisis descriptivo de pacientes escisionadas dadas de alta de nuestra unidad de patologia cervical.

Diego Erasun Mora(1), Alazne De Castro Momoitio(2), Ana Vázquez del Campo(2), Alicia Alcantud García (2), Alicia Vega Alvarez(2), Elena Juncal Ruiz (2)
(1)Servicio Cantabro de Salud/IDIVAL (2)Hospital Universitario Marqués de Valdecilla



Introducción:

En nuestra unidad, el criterio de alta a una paciente tras una escisión cervical se basa en la obtencion posterior de dos análisis PCR-VPH negativos y colposcopias sin hallazgos patológicos, independientemente del estado de los márgenes. La recomendación al alta, es acudir a su centro del atencion primaria, realizar un cotest y si es negativo, volver al programa vigente en nuestra comunidad.

Resultados:


Objetivos:

Estudio de la dinamica evolutiva de nuestras pacientes así como evaluar variables que orienten hacia un mejor pronostico.


Material y métodos:

- Años: 2016-2023
- Conizaciones: 948
- Elegibles: 657
- Técnica: 100% ambulatorias, con anestesia local y bajo control colposcópico.
- Criterio de alta:
Dos PCR-VPH negativos
Asociado a estudio colposcópico negativo.
- Programa estadístico: SPSS® V25


Pacientes elegibles




Estatus de vacunación




Adhesión a cribado post alta



Edad



Histopatología



Conclusiones:

Los datos **orientan** a que **mujeres mas jovenes, con biopsia previa o posterior CIN I** tienen **mas posibilidades de alta** que su grupo comparativo, con resultados al limite de la significación

Las pacientes vacunadas, probablemente sean de peor pronostico, motivo por el que no habrán sido altadas.

Hemos de **reforzar los cauces y motivación para adhesión a cribado** posterior al alta

<https://www.congreso2023.aepcc.org/>