

ADENOCARCINOMA DE CÉRVIX TIPO CÉLULAS CLARAS (ADC-CC) INDEPENDIENTE DE VPH




Ruano L, Calvo J, Coronado PJ, García FJ, Bellón M, Ramírez M
Instituto de Salud de la Mujer, Hospital Clínico San Carlos (Madrid)

MATERIAL Y MÉTODOS:

Mujer de 37 años, sin AP y cribado previo negativo, consulta por **coitorragia ocasional y formación polipoidea cervical** de 1 cm no sospechosa.

Tras exéresis corresponde con un ADC-CC independiente de VPH según AP. Se efectúa estudio de extensión con colposcopia y pruebas de imagen, correspondiendo con un estadio Ib1 de la FIGO.



Cortes AP de conización (HCSC): RE, PR, CEA y CD-10 (-), **p53 wild-type > 50%, ki-67 40-50%**
1. Patrón tubulo-quístico (HE x100) 2. **CK7 y PAX8 (+)** 3. Vimentina (+) 4. Colposcopia: ZT1. Grado 1 (14h) donde se asentaba lesión excrecente. 5. RM e histeroscopia: sin hallazgos.

Se indica linfadenectomía pélvica intraoperatoria negativa, con posterior histerectomía radical laparoscópica, quedando pendiente de Oncología Médica para valorar tratamiento adyuvante.

DISCUSIÓN:



Clasificación

La OMS describe en su clasificación de Tumores de Tracto Genital Femenino (2020) los subtipos inusuales de **adenocarcinoma independientes de VPH**: tipo gástrico, de células claras, mesonefrico, endometroide, y de etiología miscelánea no especificados (NOS).



Perfil Molecular

- Baja actividad proliferativa
- **Baja expresión de CDK (p16,p14,p27)**
- **Sobreexpresión de p53**
- Mutaciones en PTEN, KRAS, ARID1A, ARID5B, CTNNB1
- Papel de determinados genes: WIG-1 o MEX3A
- Menor proporción de linfocitos infiltrantes TCD8



Perfil Clínico

- **No descritas hasta la fecha lesiones precancerosas**
- Comportamiento biológico **más agresivo**:
 - Afectación ganglionar/ELV en estadios iniciales
 - Metástasis a distancia
 - Rápido crecimiento
- Mala respuesta a QT y RT
- **Peores resultados oncológicos**

CONCLUSIONES: Es importante conocer los cánceres de cérvix independientes de VPH que pueden escapar al cribado rutinario, cuya identificación se basa en la **sospecha clínica y la exploración ginecológica**. Su detección continúa siendo un desafío, siendo necesarias nuevas líneas de investigación.