

Tratamiento de condilomatosis vaginal con ácido tricloroacético: a propósito de un caso clínico.

Lázaro Fracassa, Noelia; Ramón y Cajal, José Manuel; Gil Arribas, Laura; Reivnic, Alexandra; Lafalla Bernad, Olivia.

INTRODUCCION

Los condilomas en la mucosa vaginal se presentan generalmente como lesiones múltiples, sobreelevadas y rugosas; de coloración blanquecina o rosada, y con frecuencia son lesiones multifocales.

MATERIAL Y MÉTODOS


Se presenta un caso clínico de una de 62 años en seguimiento en la Consulta de Patología del Tracto Genital Inferior por **VPH positivo** para el grupo de otros tipos de alto riesgo oncogénico y para el genotipo 16, con citología negativa. Durante la exploración ginecológica en el primer control anual, se observan múltiples **lesiones exofíticas blanquecinas** en cara en cara lateral izquierda y fondos de saco vaginal.

Ante el diagnóstico de **condilomatosis vaginal**, se instauró tratamiento con ácido tricloroacético con periodicidad bimensual. Tras la aplicación del mismo en cuatro ocasiones, se objetivó la desaparición completa de las lesiones vaginales. No ha presentado recidiva hasta la actualidad.


CONCLUSIONES

El **ácido tricloroacético (TCA)** es uno de los tratamientos de elección para la condilomatosis vaginal, ya que la podofilotoxina o los tratamientos inmunomoduladores están contraindicados por su riesgo de absorción sistémica o mucositis.

El TCA es un agente caústico que destruye los condilomas mediante coagulación química de las proteínas y daño directo del ADN viral. Se utiliza como tratamiento de condilomas en genitales externos o mucosas (anogenitales), no voluminosos y extensos. Muestra una tasa de aclaramiento de las lesiones del **56-81%**. Puede aplicarse hasta un **máximo de 3 meses**, desapareciendo las lesiones en la mayoría de las ocasiones entre las 4 y 6 semanas tras el inicio del tratamiento.



ANTES de la aplicación de TCA



DESPUÉS de la aplicación de TCA