

Revisión de casos de adenocarcinoma de cérvix en el Complejo Asistencial Universitario de León



Lozano Gómez L; Martín Corral AV; Guillén González A; Ferrera Molina E; Otero Pardo M; Fraile López E

Objetivos:

El adenocarcinoma de cérvix constituye el segundo tipo histológico más frecuente, con un incremento en su incidencia. Afecta fundamentalmente a mujeres entre 30 y 40 años, aunque en ocasiones se escapa de los programas de cribado. El objetivo principal es revisar la incidencia de dicha estirpe tumoral, el perfil de las pacientes, y la efectividad del cribado en estadios precoces.

Material y métodos:

Estudio observacional descriptivo retrospectivo a partir de base de datos del servicio de Anatomía Patológica del CAULE, en el periodo entre enero 2021 y agosto 2023.


Resultados:

Se diagnosticaron 58 casos de cáncer de cérvix, de los cuales un 37,9% se correspondieron con adenocarcinomas. Dos fueron subtipos histológicos menos prevalentes, uno células claras y otro villoglandular. La edad media fue de 54 años (mínima de 33 y máxima de 85 años). Un 68.2 % de las pacientes estaban asintomáticas, llegando al diagnóstico por alteraciones en las pruebas de cribado, mientras que un 31.8 % se diagnosticaron tras biopsia de cérvix en pacientes con síntomas, lo más frecuente el sangrado. En el momento del diagnóstico un 31.8 % de los adenocarcinomas eran in situ, en contraposición a un 68,2% de infiltrantes. La asociación con el HPV se demuestra en la mayoría de nuestras pacientes, siendo responsables serotipos de alto riesgo en un 59 % de los casos, de los cuales, los más frecuentemente asociados fueron el HPV 16 (31.8%) seguido del 18 y 45, ambos con un porcentaje del 13.63%.


Clínica



Infiltración



Serotipo VPH



Conclusiones:

Existe una alta incidencia de esta estirpe tumoral en nuestro entorno. El cribado tiene elevada importancia para un diagnóstico y tratamiento precoz con el objetivo de disminuir las tasas de adenocarcinomas infiltrantes. No olvidar que existen algunos subtipos histológicos no asociados al HPV cuya detección precoz supondría un reto todavía mayor.