

Tumor de células granulares vulvar

Sara Arribas García, Maite Cortés Antolín, Andrea Gutiérrez Landaluce, Alba González Sevilla, Gloria Paz Martínez Ramón, María Marqués Rodríguez

ANTECEDENTES

El tumor de células granulares puede tener localización vulvar (15%). Se presenta como lesión única. El comportamiento es benigno, aunque puede presentar agresividad local y malignidad con metástasis a distancia (2%). El diagnóstico diferencial se realiza entre lesiones quísticas benignas, fibromas, lipomas y papilomas. El diagnóstico es anatomopatológico.

RESULTADOS




59 años. Consulta por nódulo vulvar de 3 años de evolución, asintomático



Exploración: Nódulo de 2x3cm, sólido, bien delimitado, móvil y no adherido a planos profundos. Localizado en tejido subcutáneo

Ecografía transvulvar: Nódulo 46x31mm. Ecogenicidad mixta sin captación Doppler.



Biopsia: Tumor de células granulares



Tumorectomía con márgenes de 1-2 cm



AP: Tumor de células granulares. Margen quirúrgico superior a < 1mm



Comité de Ginecología oncológica: seguimiento en patología vulvar

CONCLUSIONES

El tumor de células granulares vulvar tiene dos patrones de crecimiento: nodular e infiltrante. El infiltrante tiene más posibilidades de recidiva. El tratamiento recomendado es la exéresis quirúrgica con amplios márgenes de seguridad. Si los bordes están afectados se aconseja realizar una ampliación de márgenes debido a la alta tasa de recurrencia local.