

ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE CONIZACIONES EN BLANCO EN ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO EN HOSPITAL MARINA BAIXA



de Vera Gomis, Mónica; **Reino Gelardo, Laura; Castro Ahuir, Andrea**; Díaz-Caneja Planell, Carmen; Hierro Rubio, Begoña. Hospital Marina Baixa (Villajoyosa).

OBJETIVOS

Analizar conizaciones con ausencia de displasia en resultado histológico en nuestra área de salud entre 2014 y 2022, valorando datos epidemiológicos, estudio colposcópico previo y estudio histológico

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo con un total de 37 pacientes sometidas a tratamiento escisional cervical, sin evidencia de displasia en la pieza, entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2022 en el Hospital Marina Baixa de Villajoyosa (Alicante).

CONCLUSIONES

- La ausencia de displasia se ha asociado a mujeres con edades superiores a 40 años y los serotipos 16/18 de HPV. Nuestros resultados difieren de los recogidos en otros estudios publicados, dónde se asocia a mujeres jóvenes y HPV no 16/18.
- El alto número de cervicitis (51,35%) y metaplasia encontrados, así como artefactos histológicos como el denudamiento epitelial, podrían asociarse a falsos positivos en la biopsia cervical.

RESULTADOS

Epidemiología		Pruebas diagnósticas	
Tabaco		HPV	
Fumadora	20 (54%)	Negativo	8 (21,6%)
No fumadora	13 (35%)	HPV no 16/18	10 (27,1%)
Desconocido	4 (11%)	HPV 16/18	13 (35,1%)
Edad		Desconocido	6 (16,2%)
< 25 años	1 (2,7%)	Citología	
25-30 años	3 (8,1%)	ASCUS-LSIL	12 (32,4%)
30-40 años	9 (24,3%)	ASCH-HSIL	14 (37,8%)
>40 años	24 (64,9%)	Negativa	5 (13,6%)
Vacunación		Desconocida	6 (16,2%)
No vacunadas	30 (81,1%)	Colposcopia	
Vacunadas	4 (10,8%)	Normal	3 (8,1%)
Desconocido	3 (8,1%)	Cambios grado I	12 (32,4%)
Histología pieza conización		Cambios grado II	8 (21,6%)
Metaplasia		Cambios no específicos	4 (10,8%)
Sí	11 (29,72%)	No valorable, extraclínica	10 (27,1%)
No	26 (70,28%)	Biopsia cérvix	
Cervicitis		Negativa	2 (5,4%)
No	17 (46%)	CIN I	4 (10,8%)
Aguda	1 (2,7%)	CIN II-III	27 (73%)
Crónica	9 (24,3%)	No material	4 (10,8%)
Ambas	10 (27%)	Tamaño lesión	
Artefactos histológicos		< 1cm	15 (40,6%)
Denudamiento epitelial	5 (13,5%)	>1cm	9 (24,3%)
		Tamaño no conocido	13 (35,1%)