

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA VACUNA CONTRA EL VPH SOBRE LA PREVALENCIA DE SEROTIPOS EN EL ÁREA SANITARIA DE VIGO



Leal Carro C, Losa Puig H, Vázquez Caamaño P, Porto Quintans M, Gil Andrés M, Valenzuela Besada O
Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo. Pontevedra.

ANTECEDENTES

VPH: ITS más prevalente → Riesgo **Cáncer de cérvix**
(Sobretudo los **genotipos 16 y 18**)
Cobertura de vacunación frente VPH sigue siendo **subóptima**

MÉTODOS

Estudio observacional, retrospectivo en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.


- Inclusión: pacientes nacidas a partir de 1994 que acudieron a consulta de patología cervical entre 2017 y 2021
- Datos recogidos: Edad, Vacunación, Alteraciones citológicas, presencia de VPH y tipología, Resultados anatomopatológicos
- Análisis descriptivo

RESULTADOS

310 pacientes incluidas → **68.4%** vacunadas
→ **31,6%** NO vacunadas

Alteración citológica HSIL (5,4%)

- 52% vacunadas
- 58% NO vacunadas



CONCLUSIONES

↓ prevalencia genotipos 16 y 18 en pacientes vacunadas

Insistir en la importancia de la vacunación para disminuir la prevalencia de los serotipos más oncogénicos (16 y 18)