

AUTORES: Martínez Portillo J, Sánchez Alcalá J, Fariña Arocha AC, Blanco Campos M, Calderón Cabrera AM, Bujalance Montilla F

CARCINOMA INFILTRANTE DE VULVA LOCALMENTE AVANZADO EN RELACIÓN CON VPH. A PROPÓSITO DE UN CASO.

OBJETIVOS: Dar a conocer un caso extremo que ha esquivado los cribados disponibles actualmente, y ha generado una enfermedad inoperable en una paciente joven.

CASO CLÍNICO: Mujer de **41 años** con tumoración en zona perineal que le impide la deambulación, que comenzó hace 1 año y medio como una “verruca” en labio mayor derecho, y ha ido aumentando progresivamente. Asocia **pérdida de 30kg** en los últimos 8 meses y **fiebre de 38-39°C** diaria en el último mes.

Se objetiva una **lesión de unos 20cm**, dependiente de labio mayor derecho, que abarca glúteo y tercio medio inferior de vulva, de aspecto tumoral excrecente, necrótica, mamelonada y que supura material purulento maloliente.

Analítica: Hb 8.4g/dL, leucocitos 20460/μL y proteína C reactiva 85.0mg/L.

Se decide ingreso para antibioterapia IV y estudio.

RESULTADOS:

- ✓ **Cultivo:** **positivo para P. aeruginosa** con sensibilidad intermedia a ceftazidima.
- ✓ **Serologías:** negativas para sífilis, VIH, VHA, VHB y VHC.
- ✓ **Genotipado VPH:** **positivo para VPH 16** y VPH alto riesgo no 16/18.
- ✓ **Biopsia:** **Carcinoma de células escamosas bien diferenciado e infiltrante**, con expresión de CK5/6, p40 y expresión intensa y en bloque de p16 como subrogado para su asociación con VPH.
- ✓ **TC:** adenomegalias ilíacas e inguinales bilaterales de características sospechosas. Útero y ambos anejos sin alteraciones significativas. En región perineal tumoración de contornos mal definidos, hipercaptante con aspecto infiltrante que parece centrarse en vulva.

MANEJO: diagnóstico de carcinoma epidermoide de vulva IIIB **inoperable**, positivo a VPH y **sobreinfectado**. Remitida a oncología para quimioterapia neoadyuvante según esquema **cisplatino 50mg/m2 + paclitaxel 175mg/m2**.

