

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS CONIZACIONES CON RESULTADO NEGATIVO EN EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLÓN



Laura Rubert Torró, Cristina Andrada Ripollés, Isabel González Martínez, Fabiana Núñez Núñez, Carmen Martínez Ródenas, Juan Antonio Serrano Fernández.
Hospital General Universitario de Castellón.

Justificación

- Las conizaciones cervicales por indicación citocolposcópica patológica y con resultado anatomopatológico negativo no son infrecuentes.
- La AEPCC establece como control de calidad de la unidad que este porcentaje **no supere el 15%**.
- OBJETIVO:** Revisión de las conizaciones negativas del Hospital General de Castellón a lo largo de 3 años para valorar su posible causa (regresión vs lesión extracervical vs infratratamiento).

Método


- Estudio descriptivo retrospectivo de los 35 conos en blanco hallados de un total de 330 conizaciones realizadas entre Enero 2020 y Julio 2023 en Hospital General Universitario de Castellón.

Conclusiones


- **La tasa de conos en blanco está por debajo del 15%**
- El 88.57% de los casos no muestra enfermedad en el primer control por lo que podría atribuirse a una **posible regresión lesional vs exéresis lesión con la biopsia**.
- De las 4 persistencias, 3 de ellas mostraron posteriormente un VAIN-3 por lo que se muestra la **importancia de asociar vaginoscopia** a la exploración cervical cuando la zona de transformación es tipo III y no hay lesión exocervical.

Resultados

Citología que motiva estudio



Indicación quirúrgica



- Porcentaje conos en blanco: 10,6%**
- Edad promedio: 45 años (25-63)
- Tasa fumadoras: 19/35 (54,2%)
- Vacunadas pericirugía 26/35 (74,2%)

Control postconización

