

Estudio de la alteración citológica ASC-H, serie de casos



Vázquez del Campo, Ana ; De Castro Momoitio, Alazne; Erasun Mora, Diego; Vega Álvarez, Alicia; Junca Ruiz, Elena; Alcantud García, Alicia

¿Bibliografía ASC-H?

- Atipia escamosa incierta que no descarta lesión intraepitelial de alto grado
- **Poco frecuente** (0.27-0.6%)
- Riesgo de lesión **HSIL-CIN → 26-68%**

¿ASC-H en nuestro medio?

- Aumento subjetivo de las citologías ASC-H
- Acompañado de otros cambios citológicos → Se ha precisado participación de revisión de los casos junto con anatomía patológica para su correcto manejo
- **Análisis descriptivo serie de 6 casos de pacientes captadas entre 07.2022 - 01.2023**

	Edad	Alteración citológica	VPH	Colposcopia	Biopsia	Resultado LLETZ	Seguimiento
Caso 1	27 años	LSIL / HSIL / ASC-H	16+	Cambios mayores	CIN III	CIN II-III	Biopsia posterior CIN I
Caso 2	48 años	LSIL / HSIL / ASC-H	51/61+	Cambios mayores	Biopsia Benigna	No realizado	Seguimiento perdido
Caso 3	40 años	HSIL / ASC-H	16+	Cambios menores-mayores	CIN I / Benignas	No realizado	COTEST negativo al año
Caso 4	44 años	HSIL / ASC-H	51+	Cambios mayores	CIN III	CIN I-II.	COTEST negativo al año
Caso 5	31 años	HSIL / ASC-H	31, 66+	Cambios mayores	CIN III	CIN III	COTEST negativo a los 6 meses
Caso 6	44 años	HSIL / ASC-H VPH	16, 35+	Cambios mayores	CIN III	CIN III	COTEST negativo al año

En nuestra muestra y teniendo en cuenta la limitación de su pequeño tamaño concluimos que:

- La **tasa de lesión subyacente cuando nos encontramos ante un ASC-H se acerca más a la descrita en el caso del HSIL** que en el caso del ASC-H.
- Uno de los **inconvenientes es el diagnóstico concomitante con otro tipo de alteraciones citológicas**, que hace disminuir su especificidad dificultando el manejo.
- El **manejo multidisciplinar** y la reevaluación de las citologías junto con los **servicios de anatomía patológica** facilita el manejo de dicha alteración poco prevalente.

- ✓ Vacunación → **0%** Tabaco → 16.6%
- ✓ Citología informada **solo como ASC-H → 0%**
- ✓ Coexistencia alteraciones bajo/alto grado → 33.3%
- ✓ VPH 16 → **50%**
- ✓ VPH 51 → 33.3%
- ✓ **Biopsia HSIL-CIN → 66.6%**