

Alta tasa de asistencia a Urgencias por complicaciones hemorrágicas, de las pacientes conizadas tras la intervención.

Gomar Crespo, A., Jamal-Ismail Ortiz, S., Medina Buzón, IC., Álvarez Gil, Carmen, López Hernández, C.

•Objetivos:

La tasa esperada de complicaciones hemorrágicas tras conización ambulatoria es de un 5%, según bibliografía. En nuestra revisión de casos, queríamos ver si nos ajustábamos a dicha tasa. Y si no era así, encontrar los motivos que lo estaban provocando.

•Material y métodos:

Realizamos una revisión de casos correspondientes a las conizaciones ambulatorias realizadas en el gabinete del Hospital Universitario de Jerez, bajo anestesia local. Y tuvimos en cuenta la asistencia a urgencias y los motivos de dichas visitas.

•Conclusiones:

Tras revisar todos los caso apreciamos que las complicaciones hemorrágicas severas se ajustaban a lo descrito por la bibliografía, pero teníamos una tasa alta de consulta a urgencias por Sangrado escaso y preocupación por la correcta cicatrización de la intervención. Tras la época postcovid, la revisión postquirúrgica para resultados anatomopatológicos, no se realiza de manera presencial, sino telefónica, por lo que las pacientes presentan. Cierta grado de inquietud por la incertidumbre de si tenían un correcto proceso de cicatrización y manifestaban sus inquietudes. Tal vez el realizar una visita presencial tras la conización, hicieran que esas visitas no urgentes disminuyeran, al sentirse más respaldadas por sus ginecólogos de referencia.

Resultados

