

INFECCIÓN VPH MULTICÉNTRICA: IMPLICACIONES DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS

Casuística del Hospital General Universitario Dr. Balmis 2000-2023

Soler Mialaret, L; Gil Fuentes, B; Gorgan, LS; Sala Ferichola, M; Donaire González, C; López Fernández, JA.

Las lesiones multicéntricas inducidas por el VPH afectan a dos o más áreas del tracto genital inferior. Aunque son poco frecuentes (2-5%), su importancia radica en que pueden pasar desapercibidas al examen colposcópico, aumentando las tasas de persistencia y recurrencia. Este trabajo tiene como objetivo analizar la incidencia así como estudiar el comportamiento de otras variables asociadas (edad, tiempo de aparición de las lesiones, asociación más frecuente y principales factores de riesgo) de la infección multicéntrica desde el año 2000 hasta 2023 en el Hospital General Universitario Dr. Balmis.

CIN 2 en 2019




VAIN 2 en 2023




Se ha realizado un estudio descriptivo retrospectivo. De un total de 1229 pacientes con lesiones VPH dependientes en el TGI y canal anal, se han obtenido 57 casos de infección multicéntrica, de ellas 34 presentaban inmunosupresión. Se han incluido todas aquellas pacientes que han presentado dos o más lesiones preneoplásicas o neoplásicas en el TGI (CIN, VaIN o VIN) y canal anal (AIN) de cualquier grado histológico. La incidencia en nuestro departamento ha sido de un 4,6% sobre las 1229 mujeres estudiadas con una edad media de aparición de 54 años.


Asociaciones más frecuentes



Principales factores de riesgo



Tiempo de aparición



Infección por VPH

