

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO Y CONSECUENCIAS OBSTÉTRICAS

AUTORES: Elena Juncal Ruiz, Alazne de Castro Momoitio, María Juncal Ruiz

INTRODUCCIÓN. En los últimos años varios estudios experimentales y metaanálisis han descrito una asociación significativa entre la infección por el virus del papiloma humano (VPH) y eventos adversos durante el embarazo, como incremento de partos prematuros, abortos, rotura prematura de membranas a término (RPM), trastornos hipertensivos del embarazo (EHE), muerte fetal y corioamnionitis.

PACIENTES Y MÉTODOS. Se trata de un estudio observacional retrospectivo en el que se ha analizado si existe una asociación entre la variable VPH y las variables parto pretérmino, RPM, aborto, pequeño para la edad gestacional, crecimiento restrictivo intrauterino, EHE, muerte fetal y corioamnionitis mediante un análisis de regresión logística, en una submuestra de mujeres que han tenido un parto en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) durante el año 2022.

CONCLUSIONES. No se ha encontrado una asociación estadísticamente significativa entre la infección por VPH y la presencia de eventos adversos durante el embarazo (todas las p 's $> 0,05$) con independencia del grado de virulencia del VPH. Esta ausencia de significación estadística, que difiere con lo descrito por otros estudios, podría deberse al escaso tamaño muestral de nuestro estudio, y/o a diferencias sociodemográficas entre la muestra de otros estudios y la nuestra.

OBJETIVOS. El objetivo principal es estudiar la asociación entre la infección por el VPH y la presencia de eventos adversos durante el embarazo.

