

CAMBIO DE CALIDAD DE VIDA TRAS TRATAMIENTO CON OSPEMIFENO EN PACIENTES DE CANCER DE CERVIX EN REMISIÓN QUE RECIBIERON RADIOTERAPIA



R. Mora Ruiz-Moyano; S. Vilares Calvo; M. Martínez Dolara
H.U. Marqués de Valdecilla (Santander-Cantabria)
H. Provincial de Pontevedra (Pontevedra-Galicia)

ANTECEDENTES/OBJETIVOS:

El cáncer cervical es el 4º tipo de cáncer femenino más frecuente, con una incidencia estimada de 604.000 casos y 342.000 muertes en 2020. Se trata de mujeres jóvenes o mediana edad. Se puede curar si se diagnostica en una etapa temprana y se trata pronto, aumentando las tasas de supervivencia. Los tratamientos producen efectos 2º sumados al déficit hormonal tras la cirugía y/o la radioterapia. El tratamiento del cáncer, incluida la RT, produce un alto grado de morbilidad vaginal y disfunción sexual persistente. Se deben prevenir los cambios vaginales o aliviarlos después de la terapia, aunque en la mayoría de las ocasiones lo hacemos de forma tardía. La eficacia de los SERM como opción terapéutica en la mejoría de la calidad de vida no se ha estudiado.

MÉTODOS:

Se ha propuesto tratamiento con **ospemifeno durante 3 meses a 10 pacientes** de cáncer de cérvix que han recibido **radioterapia** y presentan **intensa atrofia vulvo vaginal**. De ellas, 6 han continuado y cumplen el tiempo del criterio de inclusión. No todas han conservado su relación de pareja o mantenido vida sexual activa.

Realizamos estadística descriptiva y el análisis del cambio intrasujeto (pre-post tratamiento) se ha realizado con el Test T de Student para datos pareados. Las pruebas estadísticas fueron de dos colas con un IC del 95%.

Se realiza cuestionario de calidad de vida de la **Escala Cervantes** que valora 4 dimensiones (**menopausia, sexualidad, dominio psíquico y pareja**).

RESULTADOS:

Han mejorado todas las dimensiones de la escala global (12,85%) y en todas las esferas analizadas entre un 7 y un 14%.


CONCLUSIONES:

Debemos ser proactivos para mejorar la calidad de vida y la salud sexual de las pacientes oncológicas, especialmente en el cáncer de cérvix por sus especiales connotaciones.

El **ospemifeno** es una opción terapéutica en pacientes con radioterapia. Sería deseable realizar estudios más amplios pero encontramos muchas dificultades para reclutar pacientes y que cumplan el tratamiento.

Estudio prospectivo (n=6) con cáncer de cérvix y radioterapia y atrofia vulvo vaginal

CERVANTES (MEDIA)



<https://www.congreso2023.aepcc.org/>