

“Correlación entre resultados del cribado y el grado de lesión real en pieza de lletz.”



Alcantud García, A.¹; Vázquez del Campo, A.¹; De Castro Momoitio, A.¹; Erasun Mora, D.²; Vega Álvarez, A.¹; Juncal Ruíz, E.¹

¹Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

²Hospital Sierrallana/IDIVAL

OBJETIVOS

El objetivo del presente trabajo es analizar los resultados citológicos y serotipos de VPH que obtuvieron en sus cribados las pacientes en las que finalmente se realizó una resección cervical ambulatoria (lletz) con resultado neoplasia intraepitelial cervical (CIN) 2/3 en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla con el fin de evaluar la sensibilidad en nuestra serie y el papel que pueden tener el VPH 16 y 18 en las lesiones de alto grado.

MATERIAL Y MÉTODO

Se ha realizado un análisis retrospectivo de una muestra de 877 técnicas escisionales ambulatorias de 2016 al 2023. Se han analizado múltiples variables con respecto a las condiciones basales de las pacientes, pruebas complementarias, resultados de anatomía patológica así como el seguimiento post-técnica. Los análisis descriptivos y estadísticos se han realizado mediante el software IBM SPSS Statistics.

RESULTADOS

Del total de 877 lletz realizados a mujeres con una edad media de 42,68 años ($S \pm 11$), un 24,1% resultaron ser CIN-2 y un 45,3% CIN-3; en total un 69,4% de pacientes con lesiones de alto grado. De estas pacientes, 363/619 (58,64%) habían presentado alteraciones citológicas significativas (AGUS o H-SIL). De los falsos negativos de las citologías (41,36%), 69/256 (26,95%) fueron ASCUS, 120/256 (46,87%) L-SIL y 67/256 (26,17%) obtuvieron citologías negativas con VPH+. En cuanto a los serotipos más prevalentes, un 71,87% tenían VPH+. De ellos, un 53,19% eran VPH 16+ y un 6,23% eran VPH 18+. El resto de serotipos representan el 40,58% de estos casos.

CONCLUSIONES

En la literatura, la citología tiene una sensibilidad dispar, variando de cifras como el 45% a otras cercanas al 90%. En nuestro caso, obtenemos una sensibilidad del 59% para nuestra serie, con una tasa de falsos negativos del 41%.

Nuestros resultados se asemejan con los encontrados en la literatura general y pone de manifiesto la necesidad de realizar un cribado repetido y frecuente para aumentar la detección de estas lesiones.