

# Conos en blanco: factores asociados a ausencia de lesión en piezas de conización

Autores: Gil Fuentes B, Gorgan LS, Soler Mialaret L, Donaire González C, Palacios Marqués AM

## ➤ Introducción y objetivos

El **cono en blanco** es una pieza de conización **sin lesión residual**. Optimizar la indicación de dicha intervención y reducir el sobretratamiento requiere conocer las causas asociadas a la obtención de una pieza sin lesión.

## ➤ Material y métodos

Estudio observacional retrospectivo de casos y controles. Conizaciones en el HGU Dr. Balmis 2021 – 2023

| Variables                      | Conos en blanco<br>(n=54) | Conos CIN II/III/CA<br>(n=232) | p     |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------|
| Edad media (años)              | 41,8                      | 39,9                           | 0,09  |
| Vacunación                     | 85,2%                     | 89,5%                          | 0,25  |
| Fumadoras                      | 38,9%                     | 46,3%                          | 0,39  |
| Inmunosupresión                | 7,4%                      | 1,8%                           | 0,39  |
| Diagnóstico citológico         |                           |                                |       |
| • Normal / L-SIL / ASC-US      | 45 (83,3%)                | 175 (75,4%)                    | 0,074 |
| • H-SIL / ASC-H / AGC          | 98 (16,6%)                | 57 (24,5%)                     |       |
| Tipificación VPH               |                           |                                |       |
| • 16 o 18                      | 24 (47%)                  | 110 (48%)                      | 0,43  |
| • AR no 16/18                  | 28 (49%)                  | 119 (51%)                      |       |
| <b>Colposcopia</b>             |                           |                                |       |
| • Normal / HA grado I          | 35 (64,8%)                | 102 (44%)                      | 0,03  |
| • HA grado II                  | 19 (35,2%)                | 130 (56%)                      |       |
| <b>Biopsia</b>                 |                           |                                |       |
| • Normal / CIN I               | 8 (14,8%)                 | 3 (1,3%)                       | 0,02  |
| • CIN II / CIN III / Carcinoma | 46 (85,2%)                | 229 (98,7%)                    |       |

## ➤ Conclusiones

- Prevalencia conos en blanco en esta muestra **18,8%**
- Plantear **manejo expectante (individualizar)** en pacientes con factores asociados a cono en blanco → **reducción de complicaciones** obstétricas a largo plazo y otras complicaciones derivadas de la técnica.

## ➤ **Resultados**

