

TÍTULO: Análisis descriptivo retrospectivo de los resultados obtenidos en el estudio endometrial y cervical en pacientes con citologías ACG-NOS en nuestro centro.

Rodríguez-Rubio Corona C, Del Valle Rubido C, Salvador Osuna M, Díaz González E, Pérez Mies B, Lázaro-Carrasco de la Fuente J.

INTRODUCCIÓN: La atipia de células glandulares no especificada (ACG-NOS) constituye un resultado citológico infrecuente (<1%). Esta puede estar asociada a patología endometrial (cáncer de endometrio, pólipo endometrial), cervical (lesiones premalignas o cáncer de cérvix) u ovárica. Ante una citología con ACG-NOS, debe realizarse colposcopia y estudio endocervical. A esto deberá añadirse una ecografía vaginal y biopsia endometrial en caso de cumplir criterios: edad mayor o igual a 35 años, o menor de 35 en caso de tener factores de riesgo de cáncer de endometrio.

OBJETIVOS:

1. Analizar y evaluar los resultados obtenidos en el estudio endometrial y cervical de pacientes con citologías ACG-NOS.
2. Estudiar la patología endometrial en pacientes con ACG-NOS según franjas de edad (mayor o menor de 35 años) o estatus menopáusico.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospectivo en el que se analizaron las CML con resultado ACG-NOS de nuestra área sanitaria, entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022. Se examinó la edad, el estatus menopáusico, el motivo de la toma de CML, la realización o no de otras pruebas complementarias y sus resultados. Se descartaron CML con células neoplásicas o cánceres clínicos.

DISCUSIÓN: Según nuestros resultados, la ACG-NOS tiene un poder predictivo bajo en cuanto a patología endometrial, excepto cuando está asociada a síntomas como la MPM. Coincidiendo con la literatura, hemos visto una mayor asociación de ACG-NOS con patología endometrial en edades avanzadas y con patología cervical en pacientes jóvenes. Esto nos hace reflexionar sobre la necesidad de realizar biopsia endometrial en pacientes premenopáusicas.

RESULTADOS:

